

METODOLOGÍA DEL ATLAS DE VARIACIONES EN LA DISPENSACIÓN AMBULATORIA DE ANALGÉSICOS OPIOIDES

Objetivo. Analizar el tratamiento farmacéutico recibido por los pacientes en las comunidades autónomas (CCAA) a partir de los datos de dispensación farmacéutica para detectar posibles desigualdades entre territorios, entre hombres y mujeres y entre poblaciones con distinto nivel socioeconómico en función de su Tarjeta Sanitaria (TSI).

Unidad de análisis y Población. Zona básica de salud (ZBS) de las CCAA de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-León, La Rioja, Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña y País Vasco. Estas ZBS engloban a las poblaciones mayores de 14 años de cada ZBS distribuidas en función de sus TSI. En las TSI están excluidos los habitantes sin derecho a la prestación farmacéutica, esencialmente los adscritos a las mutualidades de funcionarios que usan su propio sistema de recetas.

Fuentes de información. Datos de dispensación obtenidos a partir de las bases de datos de medicamentos de receta oficial del Sistema Nacional de Salud entre 2017 y 2022 y registrados en los Servicios de Farmacia de las CCAA participantes.

Selección de indicadores. Indicadores adaptados, en función de los subgrupos terapéuticos por código ATC, del Plan de Optimización de la Utilización de Analgésicos Opioides en dolor crónico no oncológico en el Sistema Nacional de Salud:

- Porcentaje de morfina (N02AA01) dispensada respecto al total de opioides (N02A) considerados por ZBS
- Porcentaje de fentanilo (N02AB03) dispensado respecto al total de opioides (N02A) considerados por ZBS
- Porcentaje de codeína sola o en combinación (N02AJ06, N02AJ07, N02AJ08) dispensada respecto al total de opioides (N02A) considerados por ZBS

- Porcentaje de oxycodona sola o en combinación (N02AA05, N02AA55) dispensada respecto al total de opioides (N02A) considerados por ZBS
- Porcentaje de tramadol solo o en combinación (N02AX02, N02AJ13) dispensado respecto al total de opioides (N02A) considerados por ZBS
- Porcentaje de tapentadol (N02AX06) dispensado respecto al total de opioides (N02A) considerados por ZBS
- Porcentaje de oxycodona en combinación (N02AA55) dispensada respecto al total de oxycodona dispensada (N02AA05, N02AA55) considerados por ZBS
- Porcentaje de tramadol en combinación (N02AJ13) dispensado respecto al total de tramadol dispensado (N02AJ03+ N02AX02) considerados por ZBS

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Variabilidad

Esta sección se subdivide en 3 apartados:

- ✓ Variabilidad: muestra las variaciones de dispensación según indicadores entre las distintas ZBS de las CCAA participantes en el último año de estudio.
- ✓ Evolución: muestra la evolución en las dispensaciones según indicadores por ZBS en el periodo de estudio
- ✓ Variabilidad Hombre/Mujer: compara los resultados de los indicadores entre hombres y mujeres en el último año de estudio.

- ✓ Variabilidad por Nivel Socioeconómico bajo/alto: compara los resultados de los indicadores entre la población con nivel socioeconómico bajo o con una renta anual inferior a 18.000€ definido por los niveles de copago TSI 000 (sin aseguramiento), TSI 001 (farmacia gratuita), TSI 002 (solo pensionistas < 18.000 euros) y TSI 003 (activos < 18.000 euros) por un lado y por otro lado, TSI 002 (pensionistas entre 18.000 y 100.000 euros), TSI 004 (activos entre 18.000 y 100.000 euros) y TSI 005 (activos y pensionistas > 100.000 euros) en el último año de estudio.

En los mapas de zonas básicas de salud, los indicadores de dispensación farmacéutica ambulatoria de opioides se agrupan en quintiles de consumo para cada indicador indicando en la leyenda el rango de porcentaje respecto a los denominadores específicos que abarca cada uno de ellos. El color más oscuro de los mapas significa un mayor consumo en cada uno de los indicadores seleccionados en comparación a su respectivo denominador.